SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

Emulsão Gema de Ovo (ISO)
7982 Egg Yolk Emulsion, 100ml

Uso Previsto
Emulsão Gema de Ovo (ISO) é uma suspensão estéril de gema de ovo 50% estabilizada em solução salina utilizada como enriquecimento em meios de cultura para bactérias.

Princípios do Procedimento
Emulsão Gema de Ovo é adicionada em vários meios para a identificação de espécies de C*lostridium, Bacillus* e *Staphylococcus*, com base na presença de lipase e/ou lecitinase.

Para o uso com:

7741 Ágar MYP Base: Este meio diferencia *B. cereus* de outras bactérias com base na resistência à polimixina B, ausência de fermentação de manitol e presença da lecitinase. Após a preparação e esterilização do meio base, adicione assepticamente 50 mL de Emulsão de Gema de Ovo e 10 mL da solução estéril de Polimixina B, 50.000 UI (7997) em 900 mL do Meio MYP Base.

7442 Ágar Bacillus Cereus: Este meio diferencia *B. cereus* de outras bactérias com base na resistência à polimixina, ausência de fermentação de manitol e presença da lecitinase. Após a preparação e esterilização do meio base, adicione assepticamente 50 mL de Emulsão de Gema de Ovo e 10 mL da solução estéril de Polimixina B, 50.000 UI (7997) em 950 mL do Ágar Bacillus Cereus.

9188 Ágar Clostridium Perfringens: *C. perfringens* demonstra a atividade da lecitinase, causando a formação de uma zona opaca ao redor da colônia. Após a preparação e esterilização do meio base, adicione assepticamente 100 mL da Emulsão de Gema de Ovo em 900 mL do Ágar Clostridium Perfringens. Adicione o suplemento antimicrobiano de escolha para preparar o Ágar TSC ou Ágar SFP.

Fórmula:
Gema de Ovo ……..50 mL
Solução Salina, estéril…...50 mL

Modo de Preparo
1. Siga as instruções do meio base para a preparação do meio de cultura utilizando o enriquecimento de gema de ovo.

Especificações do Controle de Qualidade
Aparência: Emulsão de Gema de Ovo é uma suspensão amarela e opaca.

Procedimento de Reconstituição
A Emulsão de Gema de Ovo está pronta para ser utilizada.

Armazenamento
Armazene o frasco fechado entre 2–8°C. Se aberto e não completamente utilizado, certifique-se de que os procedimentos de dispensa asséptica sejam seguidos para manter a esterilidade do suplemento. Proteja contra a contaminação mantendo o frasco devidamente fechado.

Validade
Refira-se à data de validade no frasco. A emulsão deve ser descartada se não estiver estéril ou se houver mudança na coloração original. A validade se aplica a emulsão em sua embalagem intacta quando armazenada como indicado.

Limitações do Procedimento

A Emulsão de Gema de Ovo deve ser suspensa novamente antes de sua utilização. Misture manualmente gentilmente sem gerar espuma ou bolhas.

Embalagem

Emulsão de Gema de Ovo (ISO)

Código Nº	**7982**	**100 mL**

Informação Técnica

Contate a Neogen do Brasil para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de cultura desidratado no telefone 19.3935-3727.

Contate a Acumedia Manufacturers, Inc. para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de cultura desidratado no telefone +1 (517)372-9200 ou fax +1 (517)372-2006.